

花柳病治療學

前部尿道炎	潤濁	透明
全尿道炎	強度潤濁	輕微潤濁
膀胱炎	輕微潤濁	強度潤濁
尿道膀胱炎	潤濁	潤濁

淋病之豫後。因急慢性而不同。急性者治得宜。攝生有方。約四六星期可愈。如有合併症。則時機動輒延長。且使變後不良。病人視者等閒。不及早治之。勢必成慢性。甚者來尿道狹窄之症。致生命于危險。男子慢性淋病。慢性淋即急性淋之末期。往而不治。常流稀薄似膿之液也。在經過之中。諸症忽進忽退。因之治愈遲緩。忌淋毛三月以上而猶不愈者。則謂之慢性淋。一說則謂之一月半以上。尚洩膿液者。亦得自爲慢性。其變後之原因甚多。有爲停止注射過早者。有因注射藥液刺激太甚者。有因嗜酒或操勞太甚者。他如體素羸弱。亦足爲其誘因。他覺之症候。俾尿道口有少許似膿之液洩出而已。亦有用指擠之。方發現者。或尿中有淋病絲。自覺之症候甚微。雖溺時亦不覺痛。

幸  
福  
園

[illegible]

口墮燼趣

來！高富貴着這先  
 來來！高富貴着這先  
 問敢於生天生火燒。這此怒年生在迎親甲乙這抱  
 也是毒火一生在曬姊姊你。理這道家。便。天了你  
 之。一之道。某中  
 是像個。一他中  
 為我。所。一我  
 姊姊一以語授姊  
 火燒個外校外校  
 問學症瘡科醫教  
 上生習過學。員  
 的。生。

幸福報

弘儀署

■ 爲父母者應具的醫藥常識

小兒驚風症最宜注意之一點

究竟這小孩子怎麼死的呢。第一。是醫生不知病原。用藥不對症。第二。是做父母的。沒有醫藥常識。眼着那班醫生。殺了他兒子。所以也就等於他自己殺了他自己的兒子一樣。別的醫生。都說風濕兩字。既是病名。也就推知他的病原了。是因風寒而得的。非用風濕兩字。不可。有的說是因風而得的。非用感冒藥不可。而在我看呢。風濕兩字。是病狀。不是病原。因為這病發作的時候。一驚一風。一驚一風。而得的。被風吹的一般。亂舞亂飛。不能自止。所以因他病狀。稱他叫驚風。惹得那裏人。莫明一妙。都說驚風是病原。其實驚風原在那裏呢。我敢下斷語。百分之九十。是在感冒食滯。因為小孩子小得很。沒有七情動其志。沒有六慾亂其心。所謂只知啼哭就哭而已。不能發父母。但是做父母的。愛子甚於愛自己。所以只受嗔可號。已不能發兒子。換了兒子。自己換了兒子。不肯看兒子受餓。孩子又怎樣會受病呢。不知受病的最大原因。便在知道裏。

諸位須知這事。小孩子的身體。在幼時就要鍛鍊一些。才好。穿了過多。一旦衣服單薄的時候。最容易受感冒。感冒。就要發熱。發熱。就會使得腸胃反脹。所以就會發驚風病了。甚至昏糊。進而發現角弓反張。所以就會發驚風病了。小孩子的胃腸。是很薄的。不宜把牠吃得過飽。假使過飽。胃內食滯。便不消化。食滯則激胃停頓。便會發熱。發熱便會刺激胃神經。胃神經一見胃內的食滯停頓。治安安。她這分局。無筋因這要緊的胃部。被治安。連忙報告總局。總局便是腸筋。腸筋因這要緊的胃部。便也發熱起來。大起恐慌。而且小兒腸筋薄弱。無法征討。便也發熱起來。充起恐慌。所以也就昏糊疼痛起來。而角弓反張了。

所以古語說的好。『要得小兒常平安。須帶三分飢和寒。』實在是古語真訣。那麼照這樣看起來。小兒的驚風。治療的方法。最好首先要清其食滯。散其感冒。叫他不發熱。熱不去。燒灼神經。腸部不至充血。那麼風自然會好的。所以拉了一已之見的醫生。往往亂發驚風藥。而反結實無用。徒壞了小孩的性命。這樣看來。做父母的。怎能不留意留神呢。

(無言)

楊志一	朱振聲
士醫	士醫
例	診

(甲) 特製一元	貧病救済
(乙) 門診一元	路邊通加
(丙) 出診四元	次日取件
(丁) 膏丸方四元	

四時午至九上門  
時終止四下時午診  
彈第樂路雲上  
第一里會南海  
三九四三六話電  
啟處號掛



（桃蔕石）

猪苓散主之。

育車和滑，蒼北肩豆通露客，  
 粉羊羌活湯——雲霧移晴元氣  
 虛，粉羊參民決山英，秦北澤  
 附青箱子，車前羌活甘柴胡，  
 口螢星滿目

妬之心  
李健國

醫生爲人治病。但望藥能對症。病者遂愈而已。愛有嫉妬之心乎。觀世之醫生。妬心最狠。如病者先延中醫服藥無效。改延西醫治愈。甲醫乃不忍心折伏。查證西醫之治法。處用何方。竟能獲效之速。以爲研究之基礎。不此之求。反起妬心。暗中排撓西醫。以是中國醫學不能進步。卽此之故。誠爲可惜。今日我國人之習西醫者。多有此種嫉妬。其不肯用心研究中醫之奧。乃專具一片妬心。盡力毀謗中醫。不遺餘力。其存心卽爲壟斷牟利計。代西醫推銷計。猶不知西醫所不能治之病。屢被我中醫治愈者。比比皆是。此卽當爲西醫者。開智識廣研究之門徑也。西醫者。不用此心研究。反

(釋明)

【底說】醫界先哲。謂「痘瘡無一死症。」誠然。要在治之得法與否爲判耳。治之得法與否。尤以證候爲第一關鍵。證云何。卽證候之虛實寒熱也。爲醫者其誰不云。經言「虛虛實實寒熱」。然每一症臨前。虛者謂之虛。實者謂之實。寒者謂之寒。熱者謂之熱。顛倒黑白。錯亂優劣。何哉。蓋吾之罪戾。辨之爲難耳。更有一般不識症者。不能斷定其虛實寒熱。一概以通套之方劑治之。冀成功於僥倖。終貽誤於將來。是亦大可哀矣。

【治驗】甲順姓子。年十二。於前年八月間。出天然痘。初起卽然甚。至三四朝。痘仍不起。壓刮肌內。諸醫皆以爲這不起發。當以內補或托之劑進之。所用之藥。爲參、朮、陳、皮、薄、桂、皂針、炮甲、桑寄生之屬。愈近則愈熱。肌膚灼如火爐。煩燥大渴。諸語皆昏。唇裂口乾。舌燥苔黑。口出臭氣。羣醫皆曰殆矣。第五朝延子往診。予見狀大驚。不肖處方。反身欲走。病家問故。予曰。此發痘也。總誤在補托。雖吾能處方。汝亦不能照服也。連予再四而後可。乃爲處犀角一錢。羚羊角六分。生石膏四兩。鮮生地一兩。鮮石斛一兩。銀花二兩。連翹一兩。大黃五錢。生黃水三錢。荆黃連三錢。生梔子三錢。活水蘆葦半斤。熬水煎藥。鮮竹葉爲引。

幸福報答病部全體醫家爲讀者擬訂膏丸方之規制

本報各粉來函要求訂立「舊方」一。惟相者精神時間有限。故特規定編輯本報要求訂立新方者。收銀大洋四元（處時三斤。實收兩斤）。以資限制。而編輯尤宜詳述年歲。籍貫。性情。職業。婚姻。男女。已婚未婚。平日生活狀。嗜好。宿疾。形體。如係婦女。則須述婚嫁經帶情狀。如有其他顯著病症。則須述起病原因。已在病體發消經過。詳細錢財。當即擬訂遺方。務求正確適宜。無論本埠外埠。祇於信到三日內用快信寄出。來信請掛號寄交本報編輯部。本埠請直寄本報編輯部。惟須將帶回單簿蓋同單。以昭鄭重。本埠如須面談。則僅限本報主筆楊志一朱振聲兩家診所可也。

口癰瘋論治

又治一掃陽縣鄭重子。年七八歲。夜間睡時。騷擾不安。似有抽掣之狀。此亦癲癇也。亦治以此丸服至四十九全愈。此丸不但治癲癇。又善治神經之病。奉天陸軍軍官趙繼齊。年五十許。數年頭迷心亂。精神恍惚。不由自主。屢次醫治不愈。亦治以此丸。惟方中白礬改爲蓬砂。仍用一兩。水服至百丸全愈。因此丸屢用有效。遂名此丸爲氣劑丸。而以蓬砂易白礬者。名爲神丸九。

附製硫黃鉛法。用真黑鉛硫黃細末各一斤。先將鉛入鐵鍋中鎔化。即將硫黃末四五兩。撒在鉛上。其黃加疊鎔。急用鐵剷拌勻。所鎔之鉛。即變爲火色。結成砂子。其有未盡變者。又須再鎔。所鎔之鉛。即變爲火色。結成砂子。其有未盡變者。又須再鎔。將硫黃末裝滿鐵其上。勿令火熄。以鉛盡變者火色爲度。待涼入藥臼研細。其掛於藥鉢週邊。作黑亮之色者。仍係未化之砂。勿刮下使用。

(完)

口醋礬散

治走馬牙疳。腐爛流血。明凡入銅鈎內。和醋煎枯。剉下研末。加冰片乳細摻之。

口賽空青

治七十二種目疾。寒濕內障。腐肉翳睛。迎風流淚。昏花氣。時。爛眼赤腫。用搽患上。立時消腫止痛。川黃連二錢。黃柏一錢。黃芩一錢。大黃一錢。生地五分。川芎七分。歸尾一錢。赤芍五分。紅花二錢。菊花一錢。荆芥五分。防風一錢。薄荷五分。西羌活一錢五分。細辛一錢五分。蒼朮五分。甘草一錢。木賊半一錢。龍胆草五分。山椒根一錢五分。通眼七分。共煎濃汁。將浮水甘石三兩。煨淨七次。再以川連二錢。全當歸五分。木賊五分。天麻五分。大黃五分。

小藥囊

歡迎投寄

海蒲散  
消重舌。海螵蛸三錢 生蒲黃  
三錢 西瓜霜三錢 青黛一錢  
冰片一分 共末吹之。

大麻風之研究  
(中)

神經性癱瘓。一名麻痺癱。最初發于末梢神經。始爲局限性。漸而爲廣汎性。遂個完全。初時肢體一局部局部。如覺過熱。漸成麻痺。痛覺溫覺。完全消失。他如皮膚及血管運動。亦漸斷。或呈蒼白手之狀。或成截斷癱等症。然其中有宜分別癱瘓。不容少混者。卽神經性麻痺與神經性之癱瘓是也。癱瘓有表皮性與神經性之分。然以兩性混合爲最病。其效果之原。皆由桿菌傳染而致。血運緊塞。循環障礙。神經發炎。肌肉變死。卽內經所謂氣熱腐。其氣不清。故使其鼻柱壞而色敗。皮膚潰爛。瘡風客于臟而不去。名曰瘡風者是。原因既同。治法自無或殊。若癱瘓癱則因皮膚缺乏養素。未梢感覺神經。失其功用。以致不知寒熱痛癢。而成潰瘍。試觀其流出血清中養素。全無桿菌。治法以養血補風爲主。一切辛熱攻瀉重伐之劑。在所嚴禁。此其辨治之大略也。

(未完)